

---

DATUM  
2024-12-04

---

## Beslutsstöd för akut omhändertagande av patient med behandling av blodförtunnande läkemedel vid misstanke om skalltrauma

Beslutsstödet gäller för patient inskriven i kommunal primärvård med känd behandling av blodförtunnande läkemedel.

### Beslutsstöd för sjuksköterska i kommunal primärvård

#### Situation 1 Väsentligen opåverkad patient

- a) Finns omfattande behandlingsbegränsningar (vård i livets slutskede, förhandsbeslut om att avstå strolarm eller motsvarande som innebär att CT-skalle inte är aktuellt) eller patienten vill avstå utredning.
  - Patienten kvarstannar i sitt boende med god omvårdnad och tillsyn utifrån behov.
- b) Inga eller mindre omfattande behandlingsbegränsningar (CT-skalle kan bli aktuell).
  - Kontakta omgående ansvarig läkare i PV eller jourläkare för beslut om åtgärd
  - Val av transportsätt utgår från gällande riktlinjer och grundregeln är att ambulans ska tillkallas om vård- eller övervakningsbehov föreligger

#### Situation 2 – Påverkad patient (commotio, svår huvudvärk, neurologiska symtom, kramper)

- a) Finns omfattande behandlingsbegränsningar (vård i livets slutskede, förhandsbeslut om att avstå strolarm eller motsvarande som innebär att CT-skalle inte är aktuellt) eller patienten vill avstå utredning.
  - Patienten kvarstannar i sitt boende
  - Kontakta omgående ansvarig läkare i PV eller jourläkare för planering av den fortsatta vården och omvårdnaden
- b) Inga eller mindre omfattande behandlingsbegränsningar (CT-skalle kan bli aktuell).
  - Patienten ska till akutmottagningen
  - Ring ambulans (112)

Vid tillfälle om ansvarig läkare/jourläkare ej nås finns möjlighet att kontakta ledningsläkare på akutmott Hbg 042-406 38 00 eller om jourläkaren vill konsultera. Lämna endast ut till legitimerad personal.

### **Omhändertagande på plats**

- Omvårdnadspersonal ska genast kontakta tjänstgörande sjuksköterska och rapportera enligt SBAR vid fall med risk för skalltrauma eller risk för akut blödning på/i andra kroppsdelar.
- Omvårdnadspersonal ska stanna kvar på plats i patientens hem tills sjuksköterska meddelat fortsatt omhändertagande av patienten.
- Sjuksköterska ska göra hembesök och bedömning enligt Visam ska utföras.
- Sjuksköterska ska göra en bedömning av situationen enligt beslutstödet ovan och besluta om vidare åtgärder som t.ex. extra tillsyn, kontroll av vitala parametrar eller konsultation av läkare för ev fortsatta åtgärder. Vid fall utan medvetandesänkning: Kontrollera puls, blodtryck samt medvetandegrad enligt reaktionsskala RLS-85 med regelbundenhet som bedöms och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska. Om kontroller utförs av omvårdnadspersonal ska kontakt tas med tjänstgörande sjuksköterska efter varje utförd kontroll.
- En utredningsplan ska upprättas i patientjournal med åtgärder för fortsatta kontroller och uppföljning.

Beslutsstödet utgår från AKO-riktlinjen:

[Traumatisk hjärnskada hos sköra äldre - AKO Skåne-riktlinje för primärvården - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)