

Styrdokument

Dokumentets namn:

Rutin intravenös
antibiotikabehandling i
samverkande hälso- och sjukvård i
hemmet

Diarienummer:

HVO-2025-4445
FSN-2023-2360

Version: 7 rev. 2025-06-05

Typ av dokument:

Samverkansrutin

Datum för beslut:

2022-08-22

Beslutad av:

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i
Malmö stad, Enhetschefer HSL,
Enhetschef MTN Malmö,
Områdeschef SSH Malmö.

Organisation/område:

HVOF/FSF/Region Skåne

Följs upp:

2025-12-30

Framtagen av:

Styrgrupp Antibiotika

Rutin för intravenös antibiotikabehandling i samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Hos patienter med samverkande hälso- och sjukvård i hemmet (inskriven i hemsjukvård - sjuksköterska, boende på särskilt boende och vistas på korttidsboende i Malmö Stad) kan intravenös antibiotikabehandling vara ett patientsäkert alternativ. För patienten innebär det en möjlighet att få vara hemma trots behov av intravenös antibiotikabehandling.

Rutinen utgår från Läkemedelsrådets riktlinje gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet.

Vem får ordinera

Det är endast läkare som arbetar på Mobilt Team Närsjukvård (MTN) Malmö samt läkare i Sus Sjukhus hemma (SSH) som får ordinera intravenös antibiotikabehandling i hemmet.

Om ansvarig läkare på regional primärvård bedömer att patienten behöver intravenös antibiotikabehandling ska hen kontakta MTN (vardag 8–17; 0725–891121) eller Primärvårdens direktinläggningstelefon (040- 33 59 23, alla dagar 8–21).

Förutsättningar för behandling - riskbedömning

Läkare i MTN Malmö eller SSH tillsammans med sjuksköterska i kommunal primärvård ska göra en individuell riskbedömning för varje patient om det är patientsäkert att ge intravenös antibiotikabehandling i hemmet enligt [Checklista gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet](#).

Antibiotikasorter som får administreras/användas

- Cefotaxim
- Bensylpenicillin,,
- Ceftriaxone (ej på SÄBO, korttid och LSS-boende)

Ovan antibiotikasorter kan ges 1–3 gånger/dygn fördelat mellan kl. 8.00 - 21.00.

Medicinskt ansvar

I patientens journal (Procapita, PMO, Melior) ska det tydligt framgå vem som har det medicinska ansvaret, dygnet runt, under pågående antibiotikabehandling.

Tillhandahålla antibiotika

Ordinerande läkare ska säkerställa att tillräcklig mängd av antibiotika samt Mini-Spike 2 Chemo (med puresite) finns tillgänglig i hemmet för administration av intravenös antibiotikabehandling.

Läkemedelsnära produkter

Sjuksköterska i kommunal primärvård beställer/hämtar läkemedelsnära produkter enligt gällande riktlinjer.

Blandning och administrering

För information om blandbarhet, administrering och hållbarhet av antibiotikan se i Region Skånes stöd vid läkemedelshantering (vardgivare.skane.se).

Ansvarsfördelning

Ordinerande läkare ansvarar för att:

- kontrollera eventuell antibiotikaallergi är registrerad i journalen
- upprätta en medicinsk vårdplan i patientens journal där det står hur och när uppföljningen ska göras
- upprätta aktuell läkemedelslista innan läkemedel ordinerar eftersom hänsyn till pågående läkemedelsanvändning måste tas. Därefter ordinerar intravenös antibiotikabehandling i Pascal och PMO/Melior enligt Läkemedelsrådets riktlinje gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet.

Sjuksköterska i kommunal primärvård ansvarar för att:

- ha beredskap för eventuell anafylax
- säkerställa att aktuell läkemedelslista finns i patientens pärm
- använda adekvat skyddsutrustning och ha tillgång till ögondusch
- iordningställa och administrera antibiotika enligt ordination. Använd slutet system (Mini-Spike 2 Chemo med puresite)
- använda kanylburk för skärande och stickande samt kassera använd ampull och kanylfri spruta som läkemedelsavfall
- kassera skyddsutrustning i en avfallspåse direkt efter att antibiotikan har administrerats. Påsen försluts och kasseras i hushållsavfall
- stanna kvar hos patienten minst 15 minuter efter administrering
- signera given dos samt dokumentera ordinationen och uppföljningen i Procapita.

Kompletterande dokument

- Läkemedelsrådets riktlinje gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet. Finns på vardgivare.skane.se.
- Checklista gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet. Finns på vardgivare.skane.se.
- Rutin för beredskap av läkemedel inför insatser som kan medföra anafylaktisk reaktion. Finns på Komin/rutiner hälso- och sjukvård.
- Anafylaktiska reaktion (vuxen) i kommunal hemsjukvård. Finns på vardgivare.skane.se.
- Kasserade läkemedel. Finns på vardhandboken.se.